

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

BILINA® COLIRIO. Cada ml contiene: levocabastina (D.C.I.), 0,5 mg; cloruro de benzalconio (conservante), 0,15 mg.

DATOS CLÍNICOS

Indicaciones terapéuticas

Tratamiento sintomático de la conjuntivitis alérgica.

Posología y forma de administración

BILINA® Colirio es una microsuspensión; el frasco debe agitarse antes de cada aplicación.

Adultos y niños mayores de 4 años: la dosis normal es 1 gota por ojo, 2 veces al día. La dosis se puede aumentar hasta 1 gota en cada ojo, 3 ó 4 veces al día. El tratamiento debe continuarse hasta que se eliminen los síntomas.

Los pacientes deben ser instruidos, para que tomen las precauciones necesarias que eviten contaminaciones.

Ancianos: no existen datos disponibles de la utilización de levocabastina en pacientes ancianos.

En niños menores de 4 años: no existen datos disponibles de levocabastina en colirio.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Los pacientes no deben usar lentes de contacto blandas (hidrofílicas), como ocurre con cualquier preparado oftálmico que contenga cloruro de benzalconio, mientras dure el tratamiento con BILINA® Colirio.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se ha observado interacción alguna con otros fármacos.

Embarazo y lactancia

Dado que no existen estudios específicos de BILINA® Colirio en mujeres gestantes, no debe usarse en este tipo de pacientes a menos que los beneficios justifiquen los riesgos potenciales.

BILINA® Colirio puede administrarse a madres lactantes.

Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria

No cabe esperar ningún efecto.

Reacciones adversas

Ocasionalmente se ha comunicado una débil y transitoria irritación inmediatamente después de la instilación de BILINA® Colirio. Raramente se han comunicado reacciones alérgicas en la experiencia de postcomercialización.

Sobredosificación

Síntomas: no se conocen casos de sobredosificación con levocabastina. En caso de ingerirse accidentalmente el contenido del envase, no podría excluirse la posibilidad de cierto grado de sedación.

Tratamiento: en caso de ingestión accidental, debe aconsejarse al paciente la ingesta de líquidos en cantidad importante con el fin de acelerar la excreción renal del fármaco.

Relación de excipientes

Cloruro de benzalconio, propilenglicol, fosfato disódico anhidro, fosfato monosódico monohidratado, hipromelosa 2.910 4.000 cps, polisorbato 80, edetato disódico y agua purificada.

Instrucciones de uso y manipulación

Agítese bien antes de usarse.

BILINA® Colirio debe usarse en un periodo de un mes desde la primera vez que se abra el envase.

Presentación y PVP

BILINA® Colirio se presenta en envases con 4 ml, PVP 7,13 €, PVP IVA 7,42 €.