

COMPOSICIÓN BRENTAN®. Cada gramo contiene: nitrato de miconazol (D.C.I.), 20 mg; hidrocortisona (D.C.I.), 10 mg; excipientes: palmitoestearato de etilenglicol y polioxietilenglicol, glicéridos oleicos polioxietilenados, vaselina líquida, perfume, ácido benzoico, edetato disódico, butilhidroxianisol, agua purificada.

INDICACIONES Eccema agudo e infectado. Eccema crónico y recidivante. Eccema infantil y atópico. Eccema seborreico. Eccema numular. Eccema del pabellón auricular. Eccema micótico. Eccema de contacto y profesional. Dermatitis de los pliegues (intertrigo). Prurito anovulvar y escrotal. Alergias cutáneas. Picaduras de insectos. Eritema solar. Sobreinfecciones dérmicas. Micosis con componente inflamatorio.

POSOLOGÍA Aplíquese la crema sobre la superficie afectada 1 ó 2 veces al día y fricciónese hasta hacer penetrar la crema en la piel. Duración del tratamiento: de 2 a 5 semanas.

CONTRAINDICACIONES Afecciones cutáneas tuberculosas, herpes, vacuna y varicela. Se administrará con prudencia en las embarazadas y lactantes si hay que aplicarla sobre extensas superficies o en cura oclusiva.

EFFECTOS SECUNDARIOS No se han registrado acciones irritativas o reacciones alérgicas cutáneas.

PRESENTACIÓN Y PVP BRENTAN® Crema, tubo conteniendo 30 g, PVP 3,50 €. PVP IVA 3,64 €.

CON RECETA MÉDICA.