

COMPOSICIÓN DAKTARIN® Crema. Cada gramo contiene: nitrato de miconazol (D.C.I.), 20 mg; excipientes: palmitoestearato de etilenglicol y polioxietilenglicol, glicéridos oleicos polioxietilenados, vaselina líquida, perfume, ácido benzoico, butilhidroxianisol, agua purificada.

DAKTARIN® Gel oral. Cada gramo contiene: miconazol (D.C.I.), 20 mg; sacarina sódica, 1 mg; etanol (0,0093 ml) y otros excipientes, c.s.p. 1 g. Una cucharada dosificadora grande equivale a 50 mg de miconazol. Una cucharada dosificadora pequeña equivale a 25 mg de miconazol.

DAKTARIN® Polvo. Composición centesimal: nitrato de miconazol (D.C.I.), 2 g; excipientes: talco, óxido de zinc, dióxido de silicio.

DAKTARIN® GINECOLOGICO. Cada gramo de crema contiene: nitrato de miconazol (D.C.I.), 20 mg; excipientes: palmitoestearato de etilenglicol y polioxietilenglicol, glicéridos oleicos polioxietilenados, vaselina líquida, perfume, ácido benzoico, butilhidroxianisol, agua purificada.

INDICACIONES Micosis ocasionadas por dermatófitos. Tiñas. Afecciones por levaduras. Micosis provocadas por hongos diversos. Pitiriasis versicolor. Micosis postantibioterapia. Infecciones y sobreinfecciones por bacterias grampositivas. Candidiasis anal, vulvar y escrotal en niños y prematuros.

POSOLOGÍA **Infecciones cutáneas.**
Crema: aplicar 1 a 2 veces al día.
Infecciones ungueales:
Recortar la uña y aplicar la crema una vez al día, recubriéndola con esparadrapo no perforado 24 horas durante 2 a 6 meses.
Gel oral:
Debe mantenerse en la boca el mayor tiempo posible antes de ingerirlo.
Adultos:
Dos cucharadas grandes (100 mg de miconazol) cuatro veces al día.
Niños:
Una cucharada grande (50 mg de miconazol) cuatro veces al día.
Lactantes:
Una cucharada pequeña (25 mg de miconazol) 4 veces al día, extendiéndolo por la zona afectada de la boca con objeto de obtener una mayor eficacia y un retraso de la ingestión.
Polvo: espolvorear la zona afecta 1 a 2 veces al día.
DAKTARIN® Ginecológico:
Introducir profundamente en la vagina el contenido del aplicador (5 g de crema) una vez al día, de preferencia al acostarse. Tras la desaparición de los síntomas, se recomienda prolongar el tratamiento por lo menos dos días.

CONTRAINDICACIONES No se han descrito en las vías tópicas.
Gel oral: no se recomienda su uso durante el embarazo, debiéndose en todo caso sopesar los posibles riesgos con las ventajas potenciales, antes de su administración durante el mismo.

EFFECTOS SECUNDARIOS No se han registrado en las vías tópicas.
Con Gel oral pueden presentarse náuseas e incluso diarrea en tratamientos prolongados.

PRESENTACIÓN Y PVP DAKTARIN® Crema, tubo conteniendo 40 g al 2%, PVP 3,51 €, PVP IVA 3,65 €. DAKTARIN® Gel oral, tubo conteniendo 40 g, PVP 2,90 €, PVP IVA 3,02 €. DAKTARIN® Polvo, envase conteniendo 20 g al 2%, PVP 2,84 €, PVP IVA 2,95 €. DAKTARIN® GINECOLOGICO, tubo con 40 g de crema y aplicador vaginal, PVP 3,51 €, PVP IVA 3,65 €. DAKTARIN® 12 cmp. PVP 7,06 €, PVP IVA 7,34 €

CON RECETA MÉDICA.

Aportación normal.