

COMPOSICIÓN	DANILON® Crema. Cada gramo contiene: Suxibuzona (D.C.I.) 71,5 mg. Excipientes: Palmitoestearato de etilenglicol y polietilenglicol, triglicérido de los ácidos caprílico y cáprico, vaselina líquida, perfume, mertiolato sódico y agua purificada.
PROPIEDADES	La administración tópica de Suxibuzona (1,2-difenil-4-[βcarboxipropionil-oxil-metil]-4 butil-1,2-diazaciclopentano-3,5-diona) principio activo de DANILON®, consigue una acción antiflogística y antidolorosa potente en la zona afectada, sin la incomodidad y las posibles intolerancias de las otras vías.
INDICACIONES	Procesos inflamatorios en Traumatología general, laboral o deportiva: Contusiones, distensiones, luxaciones, esguinces. Tendinitis, tendoperiostitis, bursitis, epicondilitis. Reumatismos musculares, torticollis, lumbago. Periartritis escapulo-humeral. Artrosis y brotes inflamatorios en procesos artrósicos.
POSOLOGÍA	Una aplicación sobre la zona afectada 3 veces al día. Se friccionará suavemente la zona tratada hasta la absorción de la crema.
NORMAS PARA LA APLICACIÓN	No se aplicará la crema en zonas dérmicas con heridas, infecciones o quemaduras.
CONTRAINDICACIONES	Ulcus gastroduodenal activo. Cardiopatías descompensadas, nefropatías e hipertensión graves.
INTERACCIONES	No se han descrito.
EFFECTOS SECUNDARIOS	No se han registrado intolerancias dérmicas ni reacciones alérgicas locales.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	Dada su forma farmacéutica es imposible que se produzca una intoxicación en la práctica. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.
PRESENTACIÓN Y PRECIO	Tubo con 60 g de crema. PVP 2,42 €, PVP IVA 2,52 €.
	SIN RECETA MÉDICA.
	Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.