

COMPOSICIÓN	DICLAMINA®. Cada comprimido contiene: Cinarizina (D.C.I.) 20 mg. Acefinato de heptaminol (D.C.I.) 50 mg. Excipientes: manitol, polivinilpirrolidona, almidón de maíz, carboximetilalmidón sódico, estearato magnésico.
PROPIEDADES	La cinarizina componente de DICLAMINA® ejerce una acción antagonista de la entrada de Ca ²⁺ a través de la membrana de la célula muscular lisa, que se traduce por una acción antivasoconstrictora de las fibras musculares lisas de los vasos cerebrales y periféricos. Su acción depresora de la irritabilidad laberíntica indica selectivamente a DICLAMINA® en el síndrome vertiginoso. A su vez, el Acefinato de heptaminol, ejerce una acción analéptica cardiorrespiratoria que favorece y mejora el riego cerebral y periférico.
INDICACIONES	Trastornos del equilibrio: vértigos de origen central o periférico. Profilaxis de las cefaleas vasculares (jaquecas, migraña).
POSOLOGÍA	Comprimidos: de 1 a 3 comprimidos, 3 veces al día.
CONTRAINDICACIONES	No debe administrarse a pacientes con enfermedad de Parkinson o con sintomatología extrapiramidal. Fase aguda de ictus cerebral.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Puede producir somnolencia, molestias digestivas, fatiga, reacciones cutáneas y efectos anticolinérgicos (sequedad de boca, visión borrosa, etc.). Tras tratamiento prolongado puede aparecer sintomatología extrapiramidal (parkinsonismo, discinesias, acatisia, etc.)
ADVERTENCIAS	La Cinarizina puede causar somnolencia por lo que deberán tener precaución las personas que deban conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. La seguridad del empleo de Cinarizina en mujeres embarazadas no ha sido establecida. Aunque los estudios en animales de experimentación no han mostrado efectos teratogénicos, se recomienda no administrar el fármaco durante este período. Se desaconseja el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.
INTERACCIONES	Puede potenciar el efecto sedante de los depresores del sistema nervioso central (alcohol, barbitúricos, etc.) así como el efecto y/o toxicidad de anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos.
PRECAUCIONES	Deberá emplearse con cuidado en pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática. Si aparecieran síntomas extrapiramidales debe suspenderse inmediatamente el tratamiento.
SOBREDOSIFICACIÓN	No existen antídotos específicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Serevicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
PRESENTACIÓN Y PRECIO	Envase con 45 comprimidos, PVP 2,45 €, PVP IVA 2,55 €.
OTRAS PRESENTACIONES	Gotas: frasco con 90 ml, PVP 3,30 €, PVP IVA 3,43 €. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.