

COMPOSICIÓN	FUROBACTINA®. Cada comprimido recubierto contiene: Nitrofurantoína (D.C.I.) 50 mg. Excipientes: lactosa, celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, crospovidona, estearato magnésico. Recubrimiento: mezcla de hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio (E171), polietilenglicol 400, color amarillo quinoleína (E104), color índigo carmín (E132), polietilenglicol 8000, c.s.
PROPIEDADES	El principio activo N-(5-nitro-2-fururiliden)-1-amino-hidantoína (Nitrofurantoína) es un quimioterápico con acción sobre gérmenes presentes con frecuencia en infecciones urinarias tales como Proteus, Colibacillo, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus faecalis. Dicho principio activo se elimina un 45% en forma activa por la orina y su acción bactericida no se ve entorpecida por la presencia de suero, pus, orina.
INDICACIONES	Infecciones agudas y crónicas del aparato urinario provocadas por gérmenes gram positivos y gram negativos, especialmente Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Proteus y Klebsiella. No es activa frente a bacilo de Koch, rickettsias, virus y hongos.
POSOLÓGIA	Un comprimido por cada 10 kg de peso del paciente y día, repartidos en 4-6 tomas, principalmente después de las comidas.
CONTRAINDICACIONES	Primer trimestre del embarazo. Contraindicado en anuria y trastornos graves del funcionalismo renal y en pacientes hipersensibles al fármaco.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Se han registrado pirosis gástrica, náuseas, vómitos, reacciones de sensibilización y neuropatías periféricas, que regresan al suspender la medicación
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	Si por grave error de dosificación o descuido en la infancia se presentan síntomas de intoxicación, se provocará el vómito y se realizará tratamiento sintomático. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20
PRESENTACIÓN Y PRECIO	Envases con 20 comprimidos, PVP 1,49 €, PVP IVA 1,55 €. Envase con 50 comprimidos, PVP 2,18 €, PVP IVA 2,27 €.
CON RECETA MÉDICA	
Fabricado por Laboratorios Dr. Esteve, S.A. Martorelles	
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.	