

COMPOSICIÓN	HEMO® 141. Cada comprimido contiene: Etamsilato (D.C.I.) 250 mg. Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona, ácido cítrico, estearato magnésico, bisulfito sódico.
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE	Comprimidos. Envase con 15 y 30 comprimidos.
ACTIVIDAD	La cicloexadienolona sulfona de dietilamina (etamsilato), principio activo de HEMO® 141, disminuye el tiempo de sangría y tiende a la normalización de la fragilidad y la permeabilidad capilar alteradas. Su acción terapéutica es, por tanto, hemostática y angioprotectora.
INDICACIONES	Prevención y tratamiento de las hemorragias muy especialmente las en "sábana", en cirugía general y especializada (Ginecología, Obstetricia, O.R.L., Odontostomatología, Oftalmología, Urología, etc.). Tratamiento de las hemorragias médicas pulmonares, digestivas, renales, ginecológicas, etc. Prevención y tratamiento de las alteraciones vasculares (fragilidad y permeabilidad aumentadas) en hipertensos, arteriosclerosos, obesos, diabéticos, cirróticos. Púrpuras infecciosas, medicamentosas y tóxicas. Alteraciones capilares retinianas y conjuntivales. Esquimosis y hematomas. Capilaritis.
CONTRAINDICACIONES	No se han descrito.
PRECAUCIONES	No hay que tomar ninguna precaución específica.
INTERACCIONES	No se han descrito.
ADVERTENCIAS	Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico. Embarazo y lactancia No se aconseja la administración de HEMO® 141 a la mujer embarazada ni al lactante. Efectos sobre la capacidad de conducción No se han descrito. Uso en ancianos y uso en niños No procede alterar la dosis en ancianos ni niños.
POSOLÓGIA	ANGIOPROTECTOR -Prevención y tratamiento de los casos crónicos: de 4 a 6 comprimidos diarios. HEMOSTÁTICO -Profiláctica quirúrgica: 2 a 4 comprimidos, haciendo coincidir la última dosis 3 horas antes de la intervención. -Curativa. Dosis de ataque: 2 comprimidos cada 4-6 horas. -Dosis de sostenimiento: 2 a 8 comprimidos diarios.
SOBREDOSIS	En caso de error grave de dosificación o por accidente en niños, se realizarán las medidas clásicas para la eliminación del fármaco y tratamiento sintomático habitual. Consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.
REACCIONES ADVERSAS	No se han descrito, pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma del medicamento, consulte a su médico farmacéutico.
CADUCIDAD	Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase
PRESENTACIÓN Y PRECIO	HEMO® 141, 15 cmp. PVP 1,78 €, PVP IVA 1,85 €. HEMO® 141, 30 cmp. PVP 2,27 €, PVP IVA 2,36 €. HEMO® 141, 5 iny. PVP 1,58 €, PVP IVA 1,64 €.

CON RECETA MÉDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

Titular y fabricante
Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona.