

COMPOSICIÓN	LOMPER® Comprimidos. Cada comprimido contiene: mebendazol (D.C.I.), 100 mg; sacarina sódica, 5 mg; excipiente, c.s. LOMPER® Suspensión. Cada cucharadita de 5 ml contiene: mebendazol (D.C.I.), 100 mg; sacarina sódica, 6,25 mg; sacarosa, 500 mg.
INDICACIONES	Tratamiento de las parasitosis intestinales, tanto simples como mixtas: oxiuriasis, ascaridiasis, trichuriasis, anquilostomiasis.
POSOLOGÍA	Oxiuriasis: una sola dosis de 100 mg en comprimidos, o una cucharadita de 5 ml de suspensión. Se tomarán medidas para evitar la reinfestación y preferiblemente se tratará simultáneamente a todos los miembros de la familia. Ascaridiasis, trichuriasis, anquilostomiasis o infecciones mixtas: 2 comprimidos o dos cucharaditas al día, una por la mañana y otra por la tarde, durante tres días consecutivos. Si la parasitosis no ha desaparecido a las tres semanas, se recomienda repetir al tratamiento.
CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad al mebendazol. No debe usarse durante el embarazo.
INTERACCIONES	La administración simultánea con cimetidina puede inhibir el metabolismo de mebendazol a nivel hepático, con lo cual se incrementan las concentraciones plasmáticas del fármaco, especialmente durante tratamientos prolongados. En este caso, se recomienda determinar los niveles plasmáticos del mebendazol con el fin de ajustar la dosis adecuadamente.
EFFECTOS SECUNDARIOS	En ocasiones pueden producirse dolores abdominales o diarrea, asociadas a expulsión masiva de parásitos. Raramente se han comunicado reacciones de hipersensibilidad tales como: exantema, rash, urticaria y angioedema.
PRECAUCIONES	La experiencia clínica con el mebendazol en niños menores de 1 año es escasa y se han comunicado muy excepcionalmente casos de convulsiones en este grupo de edad; por este motivo, únicamente se administrará LOMPER® a este tipo de pacientes cuando la infección parasitaria interfiera significativamente con su estado nutricional y su desarrollo físico.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	En el caso de sobredosificación accidental pueden manifestarse calambres abdominales, náuseas, vómitos y diarreas. En pacientes tratados con dosis masivas durante tiempos prolongados, se han comunicado ocasionalmente alteraciones reversibles de la función hepática, hepatitis y neutropenia. No existe antídoto específico. Puede realizarse lavado gástrico con solución acuosa de permanganato potásico (20 mg/100 ml) y también, administrarse carbón activado.
ADVERTENCIA	La suspensión contiene 500 mg de sacarosa en 5 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.
PRESENTACIÓN Y PVP	LOMPER® Comprimidos, caja con 6 comprimidos, PVP 2,81 €. PVP IVA 2,92 €. LOMPER® Suspensión, frasco conteniendo 30 ml de suspensión, PVP 2,92 €. PVP IVA 3,03 €.
	CON RECETA MÉDICA.
	Aportación normal.