

COMPOSICIÓN	MASDIL®. Cada comprimido contiene: diltiazem (D.C.I.), clorhidrato 60 mg; excipientes: lactosa, ácido esteárico, aceite de ricino hidrogenado, carboximetilcelulosa, estearato magnésico, dióxido de silicio.
PROPIEDADES	El diltiazem es un antagonista de los iones Ca ²⁺ por los canales lentos de la célula muscular. Su acción coronariodilatadora y disminuidora de las resistencias periféricas hacen de MASDIL® una terapia adecuada de las diversas formas clínicas de la cardiopatía isquémica.
INDICACIONES	Angor de esfuerzo y decúbito. Insuficiencia coronaria. Profilaxis de la cardiopatía isquémica. Tratamiento de las secuelas anginosas postinfarto. Tratamiento de la hipertensión arterial moderada.
POSOLÓGIA	Insuficiencia coronaria y angina de pecho: La dosis media es de 3 comprimidos al día, administrados con preferencia antes de las principales comidas. La dosis puede ser aumentada o disminuida, a criterio médico, según el estado del paciente. Hipertensión: El tratamiento de la hipertensión moderada deberá iniciarse con comprimido de 60 mg tres veces al día y, en caso de hipertensión severa, con 1 comprimido tres veces al día. En caso necesario puede aumentarse la dosis a 2 comprimidos tres veces al día como máximo. En tratamientos prolongados, y si el enfermo se mantiene asintomático a lo largo de 2-3 meses, puede reducirse la dosis a comprimido de 60 mg tres veces al día.
CONTRAINDICACIONES	No se administrará a mujeres gestantes.
INTERACCIONES	Se aconseja prudencia al asociarlo con hipotensores y betabloqueantes, ya que pueden aumentarse sus efectos (hipotensión, bradicardia). Diltiazem puede incrementar los niveles plasmáticos de digoxina y su toxicidad. Se aconseja prever un ajuste en la dosis de digoxina cuando se utilicen los dos medicamentos simultáneamente.
ADVERTENCIA	Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe valorarse la posibilidad o la conveniencia de interrumpir el tratamiento.
PRECAUCIONES	Se aconseja prudencia en pacientes que presenten bradicardia o trastornos nerviosos severos de la conducción.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Pueden presentarse discretas pirosis y malestar gástrico. Raras veces se registran: rubor facial, cefaleas, hiperplasia gingival y eritema multiforme. Se ha informado sobre elevaciones pasajeras de GOT y GPT. Con los síntomas: mareo, astenia y bradicardia, que pueden raramente aparecer como consecuencia de una hipotensión ortostática, se aconseja la reducción o interrupción del tratamiento.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	En caso de ingestión masiva accidental se procederá a lavado de estómago y tratamiento sintomático.
PRESENTACIÓN Y PVP	MASDIL® 60 Comprimidos, envase con 30 comprimidos, PVP IVA 8,23 €; envase con 60 comprimidos, PVP IVA 16,32 €. Con receta médica. Aportación reducida. T.L.D.