

COMPOSICIÓN	MASDIL® RETARD. Cada comprimido contiene: diltiazem clorhidrato (D.C.I.), 120 mg; excipientes: citrato sódico dihidrogenado, sacarosa, 69,4 mg; polivinilpirrolidona, estearato magnésico, polietilenglicol 6.000, copolímero PVC/PVAc/ PVOH, acetiltributílcitrato, aceite de castor polimerizado, bicarbonato sódico, etil vainillina, dióxido de titanio.
PROPIEDADES	El diltiazem, principio activo de MASDIL® RETARD, es un antagonista de los iones Ca ²⁺ por los canales lentos de la célula muscular lisa. Su acción coronariodilatadora y disminuidora de las resistencias periféricas hacen de MASDIL® RETARD una terapia adecuada de las diversas formas clínicas de la cardiopatía isquémica.
INDICACIONES	Angina de esfuerzo y decúbito. Insuficiencia coronaria. Profilaxis de la cardiopatía isquémica. Tratamiento de las secuelas anginosas postinfarto. Tratamiento de la hipertensión arterial moderada.
POSOLOGÍA	Dos comprimidos al día.
CONTRAINDICACIONES	No se administrará a mujeres gestantes.
PRECAUCIONES	Se aconseja prudencia en pacientes que presenten bradicardia o trastornos nerviosos severos de la conducción.
ADVERTENCIAS	El diltiazem, principio activo de esta especialidad, se encuentra en el interior de una cubierta porosa, a través de la cual va difundiendo por todo el tracto digestivo. Una vez ha difundido todo el principio activo, dicha cubierta se excreta íntegramente con las heces. Al no haberse comparado el efecto terapéutico entre las distintas especialidades con diltiazem en forma retard, no se recomienda la sustitución de una por otra, salvo expresa recomendación del médico prescriptor.
INTERACCIONES	Se aconseja prudencia al asociarlo con hipotensores y betabloqueantes, ya que pueden aumentarse sus efectos (hipotensión, bradicardia). Diltiazem puede incrementar los niveles plasmáticos de digoxina y su toxicidad. Se aconseja prever un ajuste en la dosis de digoxina cuando se utilicen los dos medicamentos simultáneamente.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Pueden presentarse discretas pirosis y malestar gástrico. Raras veces se registran: rubor facial, cefaleas, hiperplasia gingival y eritema multiforme. Se ha informado sobre elevaciones pasajeras de GOT y GPT. Con los síntomas: mareo, astenia, y bradicardia, que pueden raramente aparecer como consecuencia de una hipotensión ortostática, se aconseja la reducción o interrupción del tratamiento.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	En caso de ingestión masiva accidental se procederá a lavado de estómago y tratamiento sintomático.
PRESENTACIÓN Y PVP	MASDIL® RETARD, envase de 60 comprimidos, PVP 36,38 €. PVP IVA 37,83 € Con receta médica. Aportación reducida. T.L.D.