

COMPOSICIÓN	MIMEDRAN®. Cada comprimido contiene: Sultosilato de piperazina (D.C.I.) 500 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, polivinilpirrolidona, glicolato almidón sódico, estearato magnésico, dióxido de silicio, hidroxipiroilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000 y etilcelulosa, c.s.
PROPIEDADES	El Sultosilato, principio activo de MIMEDRAN®, es un fármaco, no emparentado químicamente con el ácido clofíbrico, que logra incrementar el Colesterol-HDL y reducir significativamente el colesterol-LDL y los triglicéridos. Estas acciones se traducen, experimentalmente, por una regresión de la placa de ateroma.
INDICACIONES	Hiperlipidemias: hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Hiperlipoproteinemias tipos IIa, IIb, III, IV y V. Arteriosclerosis en todas sus formas y localizaciones (cerebral, coronaria, periférica). Xantomatosis. Hiperagregabilidad plaquetaria.
POSOLOGÍA	Un comprimido, después de las 3 principales comidas.
CONTRAINDICACIONES	A pesar de carecer de acción teratógica experimental, no se ha establecido la ausencia de dicha acción en humanos.
INTERACCIONES	Dado que MIMEDRAN® potencia la acción de los anticoagulantes hipoprotrombinémicos y de los hipoglucemiantes orales, se adaptarán las dosis de éstos a las pruebas analíticas de control correspondiente.
EFECTOS SECUNDARIOS	Han sido descritas ligeras cefaleas, somnolencia, insomnio, gastralgias, mareos, sequedad de boca, estreñimiento y diarrea.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
PRESENTACIÓN Y PRECIOS	Envase con 45 comprimidos. PVP 5,71 €, PVP IVA 5,94 €.
	CON RECETA MÉDICA.
	Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.