

**COMPOSICIÓN** MOTILIUM®. Comprimidos. Cada comprimido contiene: domperidona (D.C.I.), 10 mg; excipientes: lactosa, almidón de maíz, celulosa microcristalina, almidón pregelatinizado, polivinilpirrolidona, estearato magnésico, laurilsulfato sódico, aceite de ricino hidrogenado, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6.000 y etilcelulosa, c.s.  
Supositorios Adultos. Cada supositorio contiene: domperidona (D.C.I.), 60 mg; excipientes: glicérido semisintético, monooleato de sorbitán, ácido tartárico, butilhidroxianisol, polietilenglicol 1.000 y 400, c.s.  
Supositorios Niños. Cada supositorio contiene: domperidona (D.C.I.), 30 mg; excipientes: glicérido semisintético, monooleato de sorbitán, ácido tartárico, butilhidroxianisol, polietilenglicol 1.000 y 400, c.s.  
Suspensión oral. Cada 100 ml contienen: domperidona (D.C.I.), 0,1 g; sacarina sódica, (0,02 g); celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa sódica, sorbitol, metilparabén, propilparabén, polisorbato 20 y agua purificada.

**INDICACIONES** Tratamiento sintomático de náuseas y vómitos de origen central y local, de cualquier naturaleza. Tratamiento de trastornos dis pépticos y sintomatología asociada a retardo del vaciamiento gastroduodenal.

**POSOLOGÍA** Comprimidos.  
Adultos y niños mayores de 7 años: 1 comprimido 3 veces al día, 10 a 15 minutos antes de las principales comidas.  
Supositorios.  
Adultos y niños mayores de 7 años: 1 supositorio de 60 mg, 2 a 4 veces al día.  
Niños de 4 a 7 años: 1 supositorio de 30 mg 3 veces al día.  
Niños de 1 a 3 años: 1 supositorio de 30 mg 2 veces al día.  
Suspensión.  
Adultos y niños mayores de 7 años: 1 cucharada de 10 ml 3 veces al día, 10 a 15 minutos antes de las principales comidas.  
Niños hasta un año: 1 cucharadita de 1,25 ml (lactantes) por cada 5 kg de peso, 3 veces al día, antes de las comidas.  
Niños de 1 a 3 años: 1 cucharadita de 2,5 ml, 3 veces al día, 10 a 15 minutos antes de las principales comidas.  
De 4 a 7 años: 1 cucharada de 5 ml 3 veces al día, 10 a 15 minutos antes de las principales comidas.

**CONTRAINDICACIONES** No se han descrito.  
Aunque en las experiencias en animales no se hayan observado efectos teratógenos, se aconseja evitar su uso en el embarazo, a no ser que, a juicio médico, el beneficio para la paciente justifique los posibles riesgos.  
Efectos secundarios  
En raros casos pueden presentarse espasmos intestinales pasajeros. Como norma general no produce efectos centrales al no atravesar la barrera hematoencefálica, pero en casos excepcionales se han descrito reacciones extrapiramidales.

**INTERACCIONES** No administrar conjuntamente con fármacos anticolinérgicos.

**ADVERTENCIA** MOTILIUM® Comprimidos contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe valorarse la posibilidad o la conveniencia de interrumpir el tratamiento.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO** No se han registrado intoxicaciones. En caso de sobredosificación accidental, se procurará eliminar el fármaco, seguido de tratamiento sintomático habitual y anticolinérgico.

**PRESENTACIÓN Y PVP** MOTILIUM® Comprimidos, envase con 30 comprimidos, PVP 3,41 €, PVP IVA 3,54 €.  
MOTILIUM® Supositorios adultos, caja con 12 supositorios, PVP 6,57 €, PVP IVA 6,83 €.  
MOTILIUM® Supositorios niños, caja con 12 supositorios, PVP 3,50 €, PVP IVA 3,64 €.  
MOTILIUM® Suspensión oral, frasco conteniendo 200 ml, PVP 2,76 €, PVP IVA 2,87 €.  
Con receta médica. Aportación normal.