

COMPOSICIÓN	PANFUNGOL® Crema. Cada gramo contiene: ketoconazol (D.C.I.), 20 mg; excipientes: propilenglicol, alcohol estearílico, alcohol cetílico, monoestearato de sorbitán, polisorbato 60, polisorbato 80, miristato de isopropilo, bisulfato sódico, agua purificada. PANFUNGOL® Gel. Cada mililitro contiene: ketoconazol (D.C.I.), 20 mg; excipientes: lauriléter sulfato sódico, monolauriléter sulfosuccinato disódico, dietanolamina de ácido graso de coco, colágeno animal hidrolizado laurdimonium, metilglucosa dioleato de macrogol 120, perfume, imidurea, cloruro sódico, eritrosina y agua purificada. PANFUNGOL® Ovulos. Cada óvulo contiene: ketoconazol (D.C.I.), 400 mg; excipientes: polietilenglicoles y butilhidroxianisol. PANFUNGOL® Polvo. Cada 100 gramos contienen: ketoconazol (D.C.I.), 2 g; excipientes: dióxido de silicio coloidal, óxido de zinc y talco, c.s.
PROPIEDADES	Antimicótico sintético del grupo del imidazol, de amplio espectro con actividad frente a los agentes responsables de micosis sistémicas, así como frente a dermatófitos y otros hongos patógenos.
INDICACIONES	Crema: Tratamiento tópico de infecciones dermatofíticas de la piel (tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis), así como para el tratamiento de candidiasis cutáneas y pitiriasis versicolor. Gel: Tratamiento tópico de infecciones por <i>Pityrosporum</i> sp., tales como dermatitis seborreica y pitiriasis capitis (caspa). Óvulos: Tratamiento local de candidiasis vulvovaginal aguda y crónica. En los casos crónicos recurrentes debe combinarse con la administración oral, para controlar el reservorio gastrointestinal de <i>Candida</i> spp. Polvo: Infecciones cutáneas y ungueales producidas por <i>Candida</i> y dermatófitos, especialmente, intertrigo y/o con presencia de exudación.
POSOLOGÍA	Vía tópica. Crema: PANFUNGOL® se aplicará una vez al día (preferentemente por la noche) sobre las zonas de la piel afectadas. El tratamiento debe prolongarse durante el tiempo suficiente o al menos hasta algunos días después de la desaparición de todos los síntomas. En casos graves y a juicio del médico, esta dosificación podrá ser aumentada hasta dos veces al día (mañana y noche). La duración usual del tratamiento es: pitiriasis versicolor, 2-3 semanas; dermatitis seborreica, 2-4 semanas; infecciones por levaduras, 2-3 semanas; tinea cruris, 2-4 semanas; tinea corporis, 3-4 semanas y tinea pedis, 4-6 semanas. Si se ha utilizado previamente un corticosteroide tópico para el tratamiento de la dermatitis seborreica debe espaciarse durante 2 semanas la utilización de PANFUNGOL® (ketoconazol) Crema, a fin de reducir la posible aparición de sensibilización cutánea inducida por esteroides como ha sucedido cuando no se ha dejado ese periodo de descanso. Gel: Se tratarán las áreas afectadas de la piel o el pelo, una aplicación dos veces por semana, durante 2-4 semanas, dejándolo actuar durante 3 ó 5 minutos antes de aclararlo. Si se ha utilizado previamente un corticosteroide tópico para el tratamiento de la dermatitis seborreica, debe esperarse un periodo de dos semanas antes de la utilización de ketoconazol Gel, a fin de reducir la posible aparición de sensibilización cutánea inducida por esteroides, como ha sucedido cuando no se ha dejado ese periodo de descanso. En el caso de no observarse mejoría clínica después de 4 semanas de tratamiento, deberá comprobarse que el diagnóstico efectuado es correcto. Se aplicarán medidas de higiene a fin de controlar las fuentes de infección o reinfección. La duración usual del tratamiento es de 2 a 6 semanas. Ovulos: Candidiasis vulvovaginal aguda (0-2 episodios infecciosos en el año anterior): un óvulo diario intravaginal durante 3 a 5 días consecutivos según la intensidad de los síntomas. Candidiasis vulvovaginal crónica recurrente (3 o más episodios infecciosos en el último año): un óvulo diario intravaginal durante 5 días consecutivos, justo al finalizar la menstruación y repetir, si fuera necesario, después de varias menstruaciones consecutivas. La aplicación del óvulo se realizará en el momento de acostarse, introduciéndolo en el fondo de la vagina. Polvo: Infecciones cutáneas: espolvorear la lesión 1-2 veces al día. No aplicar oclusión. Infecciones en el pie: espolvorear la lesión 1-2 veces al día, en particular el espacio interdigital; eventualmente, aplíquese también a zapatos y calcetines. No aplicar oclusión. Infecciones ungueales: cortar la uña infectada lo más corta posible y espolvorear 1-2 veces al día. No aplicar oclusión. El tratamiento debe proseguirse hasta algunos días después de la desaparición de los síntomas. Si transcurridas 4 semanas de tratamiento no mejorase la sintomatología, se recomienda acudir al médico. Es aconsejable aplicar medidas higiénicas con el fin de evitar la aparición de infecciones o reinfecciones.
CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad al ketoconazol y/o a alguno de los componentes de las formas tópicas, o antifúngicos del grupo de los imidazoles. Enfermedades hepáticas. Pacientes con dependencia crónica al alcohol.
EMBARAZO Y LACTANCIA	Aunque la absorción intravaginal es limitada, se aconseja evitar su uso en el embarazo, salvo que, según criterio médico, el beneficio para el paciente justifique los posibles riesgos. Ketoconazol, tras su aplicación tópica, no produce niveles plasmáticos detectables, el embarazo y la lactancia no constituyen una contraindicación para su uso. No obstante, se evaluarán los posibles riesgos antes de su utilización.
PRECAUCIONES	No deben usarse para tratamientos oftálmicos. Hipersensibilidad al fármaco y/o a sus excipientes.
INTERACCIONES	No se han descrito.
EFFECTOS SECUNDARIOS	En algunos casos puede aparecer: irritación, dermatitis o sensación de quemazón durante el tratamiento.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	Es muy improbable que pueda producir intoxicación. En caso de ingestión accidental se aplicará terapia sintomática apropiada.
PRESENTACIÓN Y PVP	PANFUNGOL® Crema, envase con 30 g, PVP 4,07 €, PVP IVA 4,23 €. PANFUNGOL® Gel, envase con 100 ml, PVP 7,49 €, PVP IVA 7,79 €. PANFUNGOL® Ovulos, 5 óvulos de 400 mg, PVP 13,32 €, PVP IVA 13,85 €. PANFUNGOL® Polvo, envase con 30 g, PVP 3,16 €, PVP IVA 3,29 €.
	CON RECETA MÉDICA.
	Aportación normal.