

COMPOSICIÓN	PROCTIUM®. Cada gramo contiene: Dobesilato de calcio (D.C.I) 125 mg. Prednisolona (D.C.I) 1 mg. Lidocaína clorhidrato (D.C.I) 4 mg. Excipientes: vaselina líquida, vaselina blanca filante, propilenglicol, palmito estearato de glicerol y polioxietilenglicol, monoleato de sorbitán polioxietilenado, perfume, propilparabeno, metilparabeno, edetato disódico y butilhidroxianisol, c.s.
PROPIEDADES	Se trata de la asociación de un protector capilar (Dobesilato de Calcio), un antiinflamatorio (Prednisolona) y un anestésico local (Lidocaína) cuyas acciones antiedematosas, antiexudativas, antiflogísticas y analgésicas se complementan en el tratamiento del síndrome hemorroidal.
INDICACIONES	Hemorroides internas y externas, simples y complicadas; hemorragias, trombosis, flebitis. Tratamiento pre y postoperatorio de los procesos anorrectales y de los tratamientos esclerosantes. Prurito y eczema anales. Proctitis. Papilocriptitis. Dermatitis anales y perianales secundarias al proceso inflamatorio hemorroidal.
POSOLOGÍA	Tratamiento inicial: Dos aplicaciones diarias, mañana y noche, durante la primera semana. Tratamiento de consolidación: Una aplicación diaria, preferentemente por la noche, durante una o dos semanas.
NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PREPARADO	Prevía retirada del tapón y perforación del tubo, se enroscará la cánula. Se introducirá dicha cánula en el recto, presionando sobre el tubo para depositar una cantidad de pomada equivalente aproximadamente a uno o dos centímetros. La cánula se retirará lentamente a medida que se vacía su contenido. Se embadumará la parte exterior del orificio anal y pliegues de la piel de los márgenes del ano. Se recomienda realizar las aplicaciones después de la evacuación intestinal y del aseo personal.
CONTRAINDICACIONES	Tuberculosis activa, procesos treponémicos activos, dermatitis virásica.
ADVERTENCIAS	Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.
INTERACCIONES	No se han descrito.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Raramente se han registrado discreta irritación o quemazón locales.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO	No se han registrado intoxicaciones por tratarse de un producto de aplicación tópica. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.
PRESENTACIONES Y PRECIOS	Tubo conteniendo 30 g, PVP 2,65 €, PVP IVA 2,76 €. Tubo conteniendo 60 g, PVP 3,54 €, PVP IVA 3,69 €.
CON RECETA MÉDICA	
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.	